

- [4] 吴征镒, 王文采, 1957: 云南热带亚热带地区植物区系研究的初步报告 I, 植物分类学报, 6: 183—254.
 [5] E. B. 吴鲁夫, 仲崇信等译, 1964: 历史植物地理学, 科学出版社。
 [6] 王正平等, 1981: 葫芦科之一新属, 植物分类学报 19(4): 481—484。
 [7] Backer, C. A. and Bakhizen, R. C., 1963: Cucurbitaceae, in Fl. Jav. 1: 292—307.
 [8] Chakravarty, H. L., 1959: Monograph on Indian Cucurbitaceae (Taxonomy and distribution), in *Rec. Bot. Surv. Ind.* 17(1): 1—234.
 [9] Clarke, C. B., 1879: Cucurbitaceae, in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 2: 604—635.
 [10] Cogniaux, A., 1881. Cucurbitacées, in DC., Monogr. Phan. 3: 325—1008.
 [11] ———, 1916: Cucurbitaceae-Fevilleae et Melothrieae, in Engl., Pflanzenr. IV. 275. 1.
 [12] Craib, W. G., 1931: Cucurbitaceae, in Fl. Siam, Enum. 1(1): 750—770.
 [13] Gagnepain, F., 1921: Cucurbitacées in Lecomte, Fl. Gén Indo-Chine, 2: 1030—1095.
 [14] Jeffrey, C. 1980; The Cucurbitaceae of Eastern Asia 1—60.
 [15] Keraudren-Aymonin, M., 1975: Cucurbitacées, in Fl. Comb. Laos et Viêt-Nam, 15: 1—123.

三角槭一新变种*

A NEW VARIETY OF ACER BUERGERIANUM

九江三角槭 新变种 图 1

Acer buergerianum Miq. var. *jiujiangense* Z. X. Yu, var. nov.

A typo recedit alis fructum erectis et inter se imbricatis, vel basi valde inflexis, prope medium inter se imbricatis, supra medium ultra axem sub angulo acuto divergentibus.

Jiangxi (江西): jiujiang (九江), alt. 90 m, arbor 25 m alta 10. Aug. 1982, Z. X. Yu (俞志雄), 8234 (Typus, JXAU¹⁾), ibid. loc. Z. M. Tan (谭泽民) 82-22。

本变种的果翅直立, 基部明显内弯, 中段叠覆, 上段越过中轴张开成锐角而与原变种区别。

俞志雄 Yu Zhi-xiong (江西农业大学 Jiangxi Agricultural University)



图 1 九江三角槭 *Acer buergerianum* Miq. var. *jiujiangense* Z. X. Yu.